

資料2 IFN フリーDAA 製剤の併用禁忌・併用注意薬 (■ :併用禁忌、 ■ :併用注意)

* 2017年12月現在の各添付文書より。

* 太矢印(↑/↓):DAA の血中濃度が増加/減少し、効果が増強/減弱するおそれがある。

* 細矢印(↑/↓);併用薬の血中濃度が増加/減少し、効果が増強/減弱するおそれがある。

			SOF	Harvoni (SOF/ LDV)	EBR	GZR	Ximency (DCV/ASV /BCV)	Maviret (GLE/PIB)
消化器系薬								
制酸剤								
	乾燥水酸化アル ミニウムゲル	アルミゲル		↓				
	水酸化マグネシ ウム	ミルマグ		↓				
H ₂ 受容体拮抗薬								
	ファモチジン	ガスター		↓*1				
	ラニチジン塩酸塩	ザンタック		↓*1				
	シメチジン	タガメット		↓*1				
	ロキサチジン酢酸 エステル塩酸塩	アルタット		↓*1				
	ニザチジン	アシノン		↓*1				
	ラフチジン	プロテカジン		↓*1				
プロトンポンプ 阻害薬								
	オメプラゾール	オメプラール、 オメプラゾン		↓*2			↓	
	ランソプラゾール	タケプロン		↓*2				
	ボノプラザンフマ ル酸塩	タケキャブ		↓*2				
	ラベプラゾールナ トリウム	パリエット		↓*2				
	エソメプラゾール マグネシウム水 和物	ネキシウム		↓*2				

			SOF	Harvoni (SOF/ LDV)	EBR	GZR	Ximency (DCV/ASV /BCV)	Maviret (GLE/PIB)
代謝系薬								
	アトルバスタチン カルシウム水和物	リピトール				↑	↑	↑
	シンバスタチン	リポバス等				↑	↑	↑
	ピタバスタチンカルシウム水和物	リバロ					↑	↑
	プラバスタチンナトリウム	メバロチン					↑	↑
	フルバスタチン	ローコール				↑	↑	↑
	ロスバスタチンナトリウム	クレストール		↑	↑	↑	↑	↑
感染症薬								
抗結核薬								
	リファブチン	ミコブチン	↓	↓	↓	↓	↓	
	リファンピシン	リファジン等	↓	↓	↓	△*3	↓	↓
抗 HIV 薬								
	アタザナビル硫酸塩	レイアタツツ			↑	↑	↑	↑
	インジナビル硫酸塩エタノール付加物	クリキシバン					↑	
	サキナビルメシル酸塩	インビラーゼ			↑	↑	↑	
	ダルナビルエタノール付加物	ブリジスタ				↑	↑	↑
	ネルフィナビルメシル酸塩	ビラセプト					↑	
	ホスアンプレナビルカルシウム水和物	レクシヴァ					↑	

			SOF	Harvoni (SOF/ LDV)	EBR	GZR	Ximency (DCV/ASV /BCV)	Maviret (GLE/PIB)
抗 HIV 薬 (続き)								
	リトナビル	ノーピア			↑			
	ロピナビル/リトナビル	カレトラ			↑	↑	↑	↑
	エトラビルン	インテレンス			↓	↓	↓	
	エファビレンツ	ストックリン			↓	↓	↓	↓
	ネビラピン	ビラミュン					↓	
	コビススタットを 含有する製剤	スタリビルド、 ゲンボイヤ				↑	↑	↑
	エルビテグラビル					↑		
	エムトリシタピン					↑		
抗 菌 薬								
	エリスロマイシン	エリスロシン					↑	
	クラリスロマイシン	クラリス、クラリシッド					↑	
抗真菌薬								
	イトラコナゾール	イトリゾール					↑	
	フルコナゾール	ジフルカン					↑	
	ミコナゾール	フロリード					↑	
	ホスフルコナゾール	プロジフ					↑	
	ボリコナゾール	ブイフェンド					↑	
抗ウイルス薬								
	テノホビル・ジソプロキシルフマル酸塩	テノゼット、ピリアード、ツルバダ		↑		↑		
	オムビタスビル水和物/パリタプレビル水和物/リトナビル	ヴィキラックス					↑	

			SOF	Harvoni (SOF/ LDV)	EBR	GZR	Ximency (DCV/ASV /BCV)	Maviret (GLE/PIB)
抗ウイルス薬 (続き)								
	テノホビル・アラフ エナミド	ベムリディ				↑		
循環器薬								
	ジルチアゼム	ヘルベッサー					↑	
	ベラパミル塩酸塩	ワソラン					↑	
	アミオダロン塩酸 塩	アンカロン		△*4				
	ジゴキシシン	ジゴシン		↑			↑	↑
	フレカイニド酢酸 塩	タンボコール					↑	
	プロパフェノン塩 酸塩	プロノン					↑	
	ボセンタン水和物	トラクリア			↓	↓	↓	
	メプロロール酒 石酸塩	セロケン、ロプレ ソール					↑	
	ダビガトランエテ キシラートメタン スルホン酸塩	プラザキサ						↑
中枢神経系薬								
	カルバマゼピン	テグレートール	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	フェニトイン	アレビアチン、 ヒダントール	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	フェノバルビター ール	フェノバルル	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	ホスフェニトイン ナトリウム水和物	ホストイン			↓	↓	↓	
	ミダゾラム	ドルミカム					↓	
	モダフィニル	モディオダール			↓	↓	↓	

			SOF	Harvoni (SOF/ LDV)	EBR	GZR	Ximency (DCV/ASV /BCV)	Maviret (GLE/PIB)
中枢神経系 薬(続き)								
	エシタロプラム シュウ酸塩	レクサプロ					↓	
	塩酸セルトラリン	ジェイゾロフト					↓	
免疫抑制薬								
	シクロスポリン	サンディミュン、 ネオーラル				↑	△*5	↑
	デキサメタゾン (全身投与)	デカドロン					↓	
	タクロリムス水和 物	プログラフ、 グラセプター				↑		
ホルモン薬								
	エチニルエストラ ジオール	プロセキソール					↓	△*6
	デソゲステレル/ エチニルエストラ ジオール	マーベロン、ファ ポワール					↓	
	ドロスピレノン/エ チニルエストラジ オール ベータデ クス	ヤーズ					↓	
	ノルエチステロン エチニルエストラ ジオール	ルナベル、オー ソ、シンフェーズ 等					↓	
	ノルゲステレル/エ チニルエストラジ オール	プラノバール					↓	
	レボノルゲステレ ル/エチニルエス トラジオール	アンジュ、トリキ ュラー					↓	

			SOF	Harvoni (SOF/ LDV)	EBR	GZR	Ximency (DCV/ASV /BCV)	Maviret (GLE/PIB)
その他								
	デキストロメトル ファン臭化水素酸 塩水和物	メジコン等					↑	
	スニチニプリンゴ 酸塩	スーテント			↑	↑		
	セイヨウオトギリソ ウ(St. John's Wort:セント・ジョ ーンズ・ワート)含 有食品		↓	↓	↓	↓	↓	↓

*1 ソホスブビル/レジパルビル配合錠を H2 受容体拮抗薬と併用する場合は、H2 受容体拮抗薬を同時投与または 12 時間の間隔をあけて投与すること。

*2 ソホスブビル/レジパスビル配合錠投与前にプロトンポンプ阻害薬を投与しないこと。併用する場合はプロトンポンプ阻害薬を空腹時に同時投与すること。

*3 併用により初期にグラゾプレビルの血中濃度が上昇する。その後併用を継続するとグラゾプレビルの血中濃度が低下する。

*4 ソホスブビル/レジパルビル配合錠とアミオダロンとの併用で徐脈などの不整脈があらわれるおそれがある(機序は不明)。

*5 シクロスポリンとの併用により含有されるアスナプレビルの血中濃度が上昇するおそれがある。アスナプレビルの肝臓への取り込みが減少し、治療効果を減弱させるおそれがある。

*6 グレカプレビル/ピブレンタスビル配合錠とエチニルエストラジオール含有製品との併用で ALT 上昇のリスクが増加するおそれがある。