

## 3 4 6 ミドドリン塩酸塩（小児科 5 8）

### ○ 標榜薬効（薬効コード）

血管収縮剤（216）

### ○ 成分名

ミドドリン塩酸塩【内服薬】

### ○ 主な製品名

メトリジン錠 2 mg、メトリジン D 錠 2 mg

### ○ 承認されている効能・効果

本態性低血圧、起立性低血圧

### ○ 承認されている用法・用量

成人にはミドドリン塩酸塩として、通常 1 日 4 mg を 2 回に分けて経口投与する。なお、症状により適宜増減する。ただし、重症の場合は 1 日 8 mg まで增量できる。

小児にはミドドリン塩酸塩として、通常 1 日 4 mg を 2 回に分けて経口投与する。なお、症状により適宜増減するが、1 日最高量は 6 mg とする。

### ○ 薬理作用

血圧上昇作用

### ○ 使用例

原則として、「ミドドリン塩酸塩【内服薬】」を「起立性調節障害」に對して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。

### ○ 使用例において審査上認める根拠

薬理作用が同様と推定される。

### ○ 留意事項

当該使用例の用法・用量

成人にはミドドリン塩酸塩として、通常 1 日 4 mg を 2 回に分けて経口投与する。なお、症状により適宜増減する。ただし、重症の場合は 1 日 8 mg まで增量できる。

小児にはミドドリン塩酸塩として、通常 1 日 4 mg を 2 回に分けて

経口投与する。なお、症状により適宜増減するが、1日最高量は6mgとする。

## ○ その他参考資料等

小児心身医学会ガイドライン集 小児起立性調節障害診断・治療ガイドライン